



ATS-ERS: COVID-19 ile ilgili güncel öneriler rehberi

COVID-19 yönetimi hakkında güncellenmiş kılavuz:

Amerikan Toraks Derneği /Avrupa Solunum Derneği tarafından koordine edilen
Uluslararası **“Task Force”**

Hazırlayan ve Çeviren: Doç. Dr. M.Onur Turan

Uzlaşa olan konular (Uzlaşa için en az %70 fikir birliđi gerekiyor)

COVID-19 pnömonili hastalarda (oksijen tedavisi alan / mekanik ventilasyon uygulanan);

- Remdesivir ve deksametazon önerilmekte, HCQ önerilmemektedir.
- Venöz tromboemboli geçiren COVID-19 hastalarında, tekrarlayan trombüs riskini azaltmak için 3 ay süreyle terapötik dozda antikoagölan tedavi verilmesi.

Uzlaşa olmayan konular (*Çoğunluk öneriyor, ancak uzlaşa yok.)

- COVID-19 sonrası 30-60 günlük dönemde SFT* – kontrol toraks BT – transtorasik ekokardiyografi - kardiyopulmoner egzersiz testi yapılması.
- Taburculuk sonrası, D-dimer normale dönene kadar profilaktik antikoagölan tedavinin devamı.
- Taburculuk sonrası rutin serolojik testler yapılması.
- SARS-CoV-2'ye karşı antikorları oluşan hastaların aktif enfeksiyon taraması yapmadan yüz yüze tıbbi randevulara katılmaları.
- Akciđer fonksiyonlarına bakılmaksızın, özel bir pulmoner rehabilitasyon programına rutin sevkı.
- 30-60 gün içinde, hastane sonrası rutin ruh sađlıđı danıřmanlıđına sevk edilmesi.
- Hastane sonrası rutin depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluđu taraması yapılması*
- Yođun bakım sonrası sendrom konusunda uzmanlařmıř bir multidisipliner kliniđe rutin sevkı.
- COVID-19 pnömonisi ile hastaneye yatırılan hastaların ev iči temaslıları için, hafif veya asemptomatik enfeksiyon olup olmadıđını belirlemek için rutin serolojik test yapılması.